




Totholz

Bearbeiter


Besiedlungsphase

	Nr.	steht	liegt	Lebewesen lebend	Spuren von Lebewesen	Größe
		☐	☐			
1-2 Jahre		☐	☐			
erste Teile der Rinde lösen sich;		☐	☐			
erste Fruchtkörper holzersetzender Pilze		☐	☐			
		☐	☐			
Raupen des Weidenbohrers;		☐	☐			
Larven der Holzwespe und zahlreicher Käferarten (z.B. Prachtkäfer, Borkenkäfer, Bockkäfer)		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			



Zersetzungsphase

	Nr.	steht	liegt	Lebewesen lebend	Spuren von Lebewesen	Größe
ab etwa 2 Jahren		☐	☐			
gesamte Rinde		☐	☐			
hat sich gelöst; vermehrt		☐	☐			
Fruchtkörper holzzersetzender Pilze		☐	☐			
Larven		☐	☐			
zahlreicher Käferarten (z.B. Bockkäfer, Hirschkäfer); zunehmend räuberische und pilzernährende Insekten z.B. Vielfüßer		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			



Humifizierungsphase

	Nr.	steht	liegt	Lebewesen lebend	Spuren von Lebewesen	Größe
nach 10-20 Jahren		☐	☐			
weiches Holz;		☐	☐			
bedeckt mit		☐	☐			
Fruchtkörpern		☐	☐			
holzersetzender		☐	☐			
Pilze;		☐	☐			
beginnender		☐	☐			
Aufwuchs;		☐	☐			
zahlreiche		☐	☐			
Käferarten (z.B.		☐	☐			
Rosenkäfer,		☐	☐			
Nashornkäfer);		☐	☐			
räuberische und		☐	☐			
pilzernährende		☐	☐			
Insekten z.B.		☐	☐			
Vielfüßer;		☐	☐			
Asseln und		☐	☐			
Schnecken		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			